


## ▼ Trend in prevalentie van stemmingsstoornissen in huisartsenregistraties

### Prevalentie van stemmingsstoornissen 1991-2014



Bronnen: FaMe-net en RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg

- Stemningsstoornissen: ICD-codes P73 en P76
- De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
- Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
- Geïndexeerd (1991 is 100)

EXPERTS EN REDACTIE >

BRONNEN EN LITERATUUR >

M.J.J.C. Poos (RIVM)

C.H. van Gool (RIVM)

### Aantal door huisarts geregistreerde patiënten met stemmingsstoornis neemt sterk toe

Het aantal patiënten met een stemmingsstoornis dat bij de huisarts bekend is, is in de periode 1991-2014 sterk toegenomen. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsamenstelling van de bevolking (standaardisatie). De toename heeft mogelijk te maken met het feit dat huisartsen depressie beter herkennen en vroeger opsporen. Dit zou weer kunnen komen door de NHG-standaard voor diagnostiek en behandeling van depressie uit 1994. Ook beschouwen huisartsen patiënten met een doorgemaakte depressie mogelijk minder snel als 'genezen'. Daarnaast is het mogelijk dat het taboe op spreken met hulpverleners over depressieve gevoelens, is afgenomen en dat mensen sneller hulp zoeken voor hun depressieklachten (Weehuizen, 2008).

### Geen toe- of afname in bevolkingsonderzoek


Het aantal mensen met een stemmingsstoornis is over een periode van ongeveer 30 jaar stabiel gebleven. Deze conclusie is gebaseerd op de uitkomsten van drie herhaalde bevolkingsonderzoeken, een regionaal (König-Zahn et al., 1999), een landelijk (de Graaf et al., 2012) en een internationaal bevolkingsonderzoek (Kessler et al., 2005).

### Meer informatie

- Definities: stemmingsstoornissen
- Bronverantwoording: huisartsenregistratie van stemmingsstoornissen
- Bevolkingsonderzoek versus huisartsenregistratie

## ▼ Trend nieuwe gevallen van stemmingsstoornissen in huisartsenregistraties

### Aantal nieuwe stemmingsstoornissen 1991-2014



Bronnen: FaMe-net en RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg

- Stemningsstoornissen: ICD-codes P73 en P76
- De indexcijfers zijn gebaseerd op 3-jaars voortschrijdende gemiddelden
- Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
- Geïndexeerd (1991 is 100)

EXPERTS EN REDACTIE >

BRONNEN EN LITERATUUR >

M.J.J.C. Poos (RIVM)

C.H. van Gool (RIVM)

### Aantal diagnoses stemmingsstoornis door huisarts neemt sterk toe

Het aantal door de huisarts gestelde nieuwe diagnoses van stemmingsstoornissen is in de periode 1991-2014 meer dan verdubbeld. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Evenals de toename in prevalentie, heeft deze toename in incidentie mogelijk te maken met het feit dat huisartsen depressie beter herkennen en vroeger opsporen.

### Meer informatie

- Definities: stemmingsstoornissen
- Bronverantwoording: huisartsenregistratie van stemmingsstoornissen
- Bevolkingsonderzoek versus huisartsenregistratie